




Tratamiento

Anticoagulación

- ✓ Valorar el riesgo de trombosis / hemorragia.
- ✓ Con HPBM (Heparina de Bajo Peso Molecular), a dosis profilácticas, medias o terapéuticas.
- ✓ Contraindicado: sangrado activo o plaquetas menores de 30.000/ul.
- ✓ Se considerarán factores de mayor riesgo trombotico en los pacientes con COVID-19 los siguientes:
 - Formas de Covid-19 grave.
 - Antecedentes personales o familiares de enfermedad trombotica venosa o arterial.
 - Trombofilia biológica conocida.
 - Cirugía reciente.
 - Inmovilización.
 - Gestación.
 - Terapia hormonal sustitutiva.



✓ Posibles dudas en farmacia comunitaria.

- La antiagregación y anticoagulación no aumenta la susceptibilidad al COVID. No se debe suspender.
- El tener TVP o superficial no indica infección por COVID.
- En pacientes sin COVID no se debe realizar tratamiento preventivo farmacológico con antiagregantes ni anticoagulantes.

EN EL CONFINAMIENTO

e-TROMBOSIS

Efecto colateral del confinamiento por inmovilidad.

Inmovilidad: Estar sentados al menos 8 horas al día de las cuales, al menos tres horas seguidas sin levantarse de la silla en las últimas 4 semanas.

Favorece la estasis venosa al disminuir el efecto compresor de los músculos sobre las venas.

